



En caso de ingestión accidental debe procederse al lavado de estómago e instaurar tratamiento sintomático.

El Ketoprofeno es dializable.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al servicio de información toxicológica de España. Teléfono 91 562 04 20.

Condiciones de almacenamiento

Consérvese a temperatura inferior a 30 °C.

Presentación

Envase con 20 y 100 cápsulas.

Venta bajo receta médica

Los medicamento deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

Fabricado por:
Laboratorios Menarini, S.A.
Badalona (Barcelona), España

391203

Fastum[®] cápsulas

Ketoprofeno 50 mg

Cápsulas - Vía oral

Composición

Cada cápsula contiene:

Ketoprofeno (D.C.I.) 50 mg


Excipientes, c.s.

Propiedades

Fastum[®], ácido 2-(-3-benzoil-fenil)- propiónico (Ketoprofeno), es un antirreumático no esteroideo dotado de una potente acción antiflogística y de interesantes propiedades analgésicas y antipiréticas. La absorción del producto en el hombre y en los animales es rápida. Se alcanzan concentraciones hemáticas máximas dentro de las dos horas, después de su administración por vía oral.

La eliminación es esencialmente por vía urinaria, en forma glucurono-conjugada.

Las experimentaciones clínicas han demostrado la eficacia terapéutica y la buena tolerancia de Fastum[®], comparada incluso con otros antiinflamatorios notables. En particular se ha encontrado una clara reducción de los síntomas de flogosis articular y de los indicios humerales de inflamación unida a una mejora progresiva de la capacidad funcional, en la artritis reumática. Otros resultados favorables se han obtenido en la osteoartrosis, espondilitis





anquilosante, y en otras enfermedades articulares como discopatías y accesos gotosos.

Indicaciones

Artritis reumatoide, osteoartrosis, espondilitis anquilosante, episodios agudos de gota.

Cuadros dolorosos asociados a inflamación (traumatismos, dolor postquirúrgico, dolor dental). Dismenorrea primaria.

Posología

Adultos: Entre 100 y 200 mg al día según cuadro clínico. Esta dosis será administrada en tomas de 50 mg regularmente repartidas y junto con alimento.

Como pauta general, se recomienda 150 mg al día y aumentar o reducir la dosis según respuesta.

Contraindicaciones

No administrar en caso de úlcera péptica activa, hipersensibilidad al fármaco, historial de reacciones alérgicas al ácido acetilsalicílico u otros antiinflamatorios o en embarazo. No administrar durante la lactancia.

Precauciones

Usar con precaución en antecedentes de úlcera o alteraciones gastrointestinales, así como en pacientes con historial de asma bronquial o enfermedades alérgicas, donde el medicamento puede precipitar un episodio de broncoespasmo.

La seguridad de uso en niños no ha sido establecida.

Incompatibilidades

El medicamento puede potenciar la acción de los anticoagulantes orales por desplazamiento de los mismos de su unión a las proteínas plasmáticas. En enfermos bajo tratamiento con anticoagulantes, la dosis de anticoagulantes debe ser reajustada durante la terapia conjunta, y la actividad de la protrombina será vigilada periódicamente.

Los antiinflamatorios no esteroideos desplazan al metotrexato de su unión a proteínas plasmáticas y reducen su secreción tubular en experimentación animal, por tanto pueden aumentar la toxicidad del metotrexato y el empleo conjunto debe ser monitorizado cuidadosamente.

No se debe administrar junto a salicilatos, ni otros agentes que tengan el potencial de producir úlcera gástrica. Debe evitarse su uso con hidantoínas y sulfonamidas de acción prolongada, ya que puede potenciar sus efectos tóxicos.

Efectos secundarios

Puede aparecer sintomatología de irritación gastrointestinal: náuseas, vómitos, dispepsia, estreñimiento, diarrea, hemorragia digestiva y aparición o reactivación ocasional de úlcera péptica.

Otros efectos secundarios que pueden presentarse son: vértigo, tinnitus, dolor de cabeza, somnolencia o insomnio. Erupciones cutáneas, prurito.

Intoxicación y su tratamiento

En caso de sobredosis ligera pueden producirse náuseas, vómitos y ardor epigástrico.