

# Espasmo Digestomen®

Pancreatina 200 mg + Dimetilpolisiloxano 80 mg

## **Comprimidos recubiertos entéricos**

Vía oral

### **Composición**

Cada comprimido recubierto entérico contiene:

Pancreatina 4x USP.....200.00 mg

Dimetilpolisiloxano (Aceite de silicona) ....92.000 mg

(Sobredosificado en 15% para compensar las pérdidas durante el proceso de fabricación)

Lactosa y otros excipientes, c.s.

### **Indicaciones**

Tratamiento sintomático del meteorismo (exceso de gases) causado por fermentación de los alimentos, dispepsia (mala digestión) por exceso de comida o por déficit de enzimas producidas por el propio organismo (insuficiencia pancreática). Las enzimas digestivas ayudan a mejorar la digestión, liberar nutrientes vitales de los alimentos y a mantener una función digestiva saludable.

### **Posología**

Niños menores de 12 años: consulte a su pediatra.

Niños mayores de 12 años y adultos: 1-2 comprimidos antes o durante las principales comidas.

Dosis máxima: 2 comprimidos por toma. 6 comprimidos por día.

### **Precauciones**

Si las molestias persisten o se agravan acuda a su médico. No utilizar por más de dos semanas sin consultar al médico. No exceder la dosis recomendada. No administrar junto con ácido fólico.

Mujeres embarazadas y en período de lactancia, consulte a su médico antes de usar este medicamento.

### **Contraindicaciones**

Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula.

### **Interacciones**

No se han descrito.

### **Intoxicación y su tratamiento**

La ingestión accidental de un gran número de comprimidos puede provocar diarrea de intensidad moderada que cede en forma espontánea. En caso de sobredosis consulte a su médico inmediatamente.

### **Reacciones adversas**

Con altas dosis se puede presentar náusea o hinchazón de pies.

### **Condiciones de almacenamiento**

Consérvese a temperatura inferior a 30 °C.

### **Presentación**

Caja con 100 comprimidos recubiertos entéricos.

### **Modalidad de venta**

Venta libre: Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y República Dominicana.

Venta bajo receta médica: Nicaragua y Costa Rica.

**Los medicamentos deben mantenerse fuera  
del alcance de los niños.**

Fabricado por

Richam Internacional, S. A. - Guatemala

Para Latin Farma, S.A. - Guatemala