

# **Meneparol® Plus**

## **Comprimidos recubiertos**

### **Vía oral**

#### **Composición**

Cada comprimido recubierto contiene:

Silimarina al 80% .....	94.00 mg
Tiamina HCl .....	5.00 mg
Riboflavina base.....	5.00 mg
Piridoxina HCl .....	5.00 mg
Cianocobalamina .....	5.00 mcg
Nicotinamida .....	15.00 mg
Lactosa y otros excipientes, c.s.	

#### **Propiedades**

**Meneparol® Plus** se utiliza como coadyuvante en el tratamiento de afecciones hepáticas y cirróticas, en una asociación tal que por sinergia lleva a cabo su actividad fármaco-terapéutica a nivel hepático, desarrollando una acción desintoxicante.

La silimarina actúa como estabilizador de la membrana celular lesionada y con ello, hace efectiva una protección completa de la glándula hepática frente a influencias nocivas, logrando la recuperación de las células hepáticas ya lesionadas, lo que se manifiesta en una mejoría del estado general, disminución de las molestias digestivas y mejora de la sintomatología hepática.

La concentración de las vitaminas del complejo B presentes en **Meneparol® Plus**, aseguran un

aporte completo para compensar las cantidades requeridas por un hígado deficiente y con una actividad metabólica reducida, lo cual hace que el medicamento posea acción antitóxica, propiedades hepatoregeneradoras y normalizadoras de la célula hepática.

#### **Indicaciones**

- Coadyuvante en toxicosis exógenas y endógenas (alimentarias, medicamentos, profesionales, etc.).
- Coadyuvante en el tratamiento de las hepatopatías cirrógénas.
- Síndrome de insuficiencia hepática.
- Hepatitis y hepatosis agudas, subagudas y crónicas.
- Lesiones de origen tóxico-metabólico, especialmente aquellos que se caracterizan por una intensa peroxidación (como por ejemplo las provocadas por la ingesta crónica de alcohol y de medicamentos hepatotóxicos): esteatosis hepática, hepatitis alcohólica, cirrosis hepática.

#### **Posología**

Según prescripción facultativa:

- **Adultos:** 1 comprimido tres veces al día, después de las comidas, durante un período de 4 a 6 semanas.
- **Dosis de mantenimiento:** 1 comprimido, 2 veces al día.

#### **Contraindicaciones, incompatibilidades, interacciones y efectos secundarios**

No se han descrito.

## **Advertencia**

### ***Importante para la mujer:***

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

## **Intoxicación y su tratamiento**

En caso de sobredosis, consultar inmediatamente con médico o llevar el paciente al hospital más cercano.

## **Condiciones de almacenamiento**

Consérvese a temperatura inferior a 30 °C.

## **Presentaciones**

Cajas con 30 y 100 comprimidos recubiertos.

**Venta libre:** Honduras, República Dominicana.

**Venta bajo receta médica:** Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá.

**Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.**

Fabricado por: Richam Internacional,  
S.A. – Guatemala

Para: Latin Farma, S.A. - Guatemala