

# Digestomen® Complex

Enzimas Digestivas

Comprimidos recubiertos

Vía oral

## Composición

Cada comprimido recubierto contiene:

Pepsina (min 10000 actividad pepsina) .....	100.00 mg
Papaína (estandarizado a 2000 USP/mg) .....	50.00 mg
Pancreatina 4X .....	50.00 mg
Proteasa (estandarizado a 100 USP/mg)	
Amilasa (estandarizado a 100 USP/mg)	
Lipasa (estandarizado a 10 USP/mg)	
Bromelina (estandarizado a 80 GDU/g) .....	50.00 mg
Amilasa (estandarizado a 5000 SKB/g) .....	50.00 mg
Lipasa (estandarizado a 10 USP/mg) .....	15.00 mg
Excipientes, c.s.	

## Propiedades

DIGESTOMEN® COMPLEX es un preparado constituido por enzimas digestivas, que actúa sobre los alimentos facilitando su digestión, o en alteraciones digestivas debidas a deficiencia o desequilibrio de enzimas, pesadez de estómago después de las comidas y digestiones lentas.

## Precauciones

Debe usted tener precaución al tomar DIGESTOMEN® COMPLEX si tiene antecedentes de úlcera gástrica o duodenal. Consulte a su médico antes de tomar enzimas digestivas si usted está embarazada o en período de lactancia.

Si los síntomas empeoran o persisten por 10 días o aparece dolor abdominal intenso, náuseas o vómitos, consulte a su médico.

## Contraindicaciones

No utilice DIGESTOMEN® COMPLEX si usted es alérgico a los productos de tipo enzimático o a las proteínas del cerdo; sufre pancreatitis aguda; tiene úlcera gástrica o duodenal; o si usted tiene o ha tenido previamente alguna reacción alérgica al calcio, kiwi, piña, papaya, látex de caucho natural, picaduras de abejas, polen de abedul o ciprés, polen de grama, zanahoria, apio, hinojo, harina de trigo o harina de centeno.

## Interacciones

DIGESTOMEN® COMPLEX puede interaccionar con los medicamentos relacionados a continuación, disminuyendo su eficacia: antiácidos, medicamentos que contengan hierro en su composición.

No tome bebidas alcohólicas concentradas mientras esté tomando DIGESTOMEN® COMPLEX, ya que puede disminuir la acción del producto.

## **Advertencias**

Uso en embarazo y lactancia: no se recomienda tomar DIGESTOMEN® COMPLEX durante el embarazo, a menos que su médico considere favorable la relación riesgo-beneficio.

**Importante para la mujer:** Si usted está embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este producto. El consumo de algunos medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

Es improbable que los principios activos de DIGESTOMEN® COMPLEX se excreten por la leche materna, pero no se recomienda tomar este producto durante la lactancia.

*Uso en niños:* para su administración en niños consulte a su médico.

## **Posología**

Se recomienda tomar 2 comprimidos al día con la comida principal, ingiriéndolos enteros con agua, leche o jugos de frutas.

## **Sobredosis**

Si accidentalmente usted ha tomado una sobredosis del producto, acuda de inmediato al médico o realice la consulta al Servicio de Información Toxicológica de su país, indicando el producto y la cantidad ingerida. En caso de ingestión de grandes cantidades de este producto, pueden aparecer trastornos gastrointestinales, calambres, diarrea, dolor o hinchazón en las articulaciones.

## **Reacciones adversas**

Con el uso de este producto ocasionalmente pueden producirse reacciones de carácter gastrointestinal como náusea, vómitos, hinchazón, estreñimiento, malestar estomacal y diarrea; en este caso se debe reducir la dosis a 1 comprimido diario. La aspiración del polvo de enzimas pancreáticas puede producir irritación de las mucosas, también pueden aparecer erupciones cutáneas. Si se observan éstas o cualquier otra reacción no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

## **Caducidad y condiciones de almacenamiento**

Este producto no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase. Consérvese a temperatura inferior a 30 °C.

## **Presentaciones**

Estuches de cartoncillo conteniendo 100 y 30 comprimidos recubiertos, en empaque blíster Alu/Alu.

## **Modalidad de venta**

Venta sin receta médica: Guatemala, Honduras.

Venta bajo receta médica: El Salvador, Nicaragua, Panamá, Rep. Dominicana.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Fecha de última revisión de este prospecto: Mayo 2018

Fabricante:

Arnet Pharmaceutical Corp. – USA

Titular: Latin Farma, S.A. - Guatemala