

Disponible en:



Spasmocyt[®] DUO es un co-empaque que contiene Bromuro de Otilonio (**Spasmocyt[®]**), Dimetilpolisiloxano y Pancreatina (**Espasmo Digestomen[®]**).

Composición

Spasmocyt[®] 40 mg¹	Espasmo Digestomen^{®2}
Cada comprimido recubierto con película contiene: Otilonio bromuro (DCI)..... 40 mg Excipientes, c.s.	Cada comprimido recubierto entérico contiene: Pancreatina 4x USP 200.00 mg Dimetilpolisiloxano (Aceite de silicona) 92.000 mg (Sobredosificado en 15% para compensar las pérdidas durante el proceso de fabricación) Lactosa y otros excipientes, c.s.

Propiedades

Bromuro de Otilonio es un espasmolítico que suprime el espasmo, las contracciones inducidas por las taquicininas aliviando, por tanto, el dolor mediante la unión del principio activo a los receptores de taquicininas. El principal mecanismo de acción del bromuro de otilonio es una combinación de propiedades antimuscarínicas y bloqueantes de los canales del calcio¹.

El Dimetilpolisiloxano y pancreatina es un tratamiento sintomático del meteorismo (exceso de gases) causado por fermentación de los alimentos, dispepsia (mala digestión) por exceso de comida o por déficit de enzimas producidas por el propio organismo (insuficiencia pancreática)².

Indicaciones

La combinación de Bromuro de Otilonio, Dimetilpolisiloxano y Pancreatina, - **Spasmocyt[®] DUO** - permite brindar una opción terapéutica integral para pacientes con estados espásticos y discinesias del canal digestivo¹ acompañado de meteorismo (exceso de gases)².

Posología

Spasmocyt [®] 40 mg ¹	Espasmo Digestomen ^{®2}
<p>La dosis usual es de 1 comprimido recubierto con película de Spasmocyt[®] 40 mg dos o tres veces al día, según juicio del médico.</p> <p>Los comprimidos recubiertos con película deben tomarse aproximadamente 20 minutos antes de las comidas, con medio vaso de agua.</p> <p>La duración máxima del tratamiento es de 4 semanas.</p>	<p>Niños menores de 12 años: consulte a su pediatra.</p> <p>Niños mayores de 12 años y adultos: 1-2 comprimidos antes o durante las principales comidas.</p> <p>Dosis máxima: 2 comprimidos por toma. 6 comprimidos por día.</p>

Ambos comprimidos pueden tomarse simultáneamente de acuerdo a recomendación médica.

POSOLOGÍA RECOMENDADA EN ADULTOS

20 minutos antes de las comidas



*o 2 veces al día según criterio médico

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo¹ o a alguno de los componentes de la fórmula².

No debe administrarse en la obstrucción intestinal.¹

Precauciones

Spasmocyt® 40 mg¹	Espasmo Digestomen®²
Debe administrarse con precaución en pacientes ancianos.	Si las molestias persisten o se agravan acuda a su médico. No utilizar por más de dos semanas sin consultar al médico. No exceder la dosis recomendada. No administrar junto con ácido fólico.
La seguridad de Spasmocyt® 40 mg durante el embarazo y la lactancia no ha sido aún establecida.	Mujeres embarazadas y en período de lactancia, consulte a su médico antes de usar este medicamento.

Incompatibilidades

No se han descrito.^{1,2}

Efectos

A la dosis usual, Spasmocyt® 40 mg es generalmente bien tolerado. Eventualmente puede causar en las personas sensibles un ligero cansancio, náuseas o ardor de estómago.¹ Con altas dosis se puede presentar náusea o hinchazón de pies.²

secundarios

Intoxicación y tratamiento

La ingestión accidental de un gran número de comprimidos puede provocar diarrea de intensidad moderada que cede en forma

espontánea.²

En caso de sobredosis consulte a su médico inmediatamente.²

Condiciones de almacenamiento^{1,2}

Consérvese a temperatura inferior a 30 °C.

Presentaciones

Co-empaque de 20 comprimidos recubiertos con película, acondicionados en blísteres de PVC/Aluminio de Spasmocyl® 40 mg¹ y 20 comprimidos recubiertos entéricos de Espasmo Digestomen®²

Venta bajo receta médica: Guatemala

Referencias: 1. Ficha técnica Spasmocyl® 40 mg. 2. Ficha técnica Espasmo Digestomen®.